

A monitor rendszerben 2017. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalbopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Járóbeteg mintákból izolált törzsek																			
Érzékeny (%)	13,8	88,5	91,5	92,0	98,9	95,6	95,3	75,0	75,9	100,0	100,0	99,3	93,2	93,8	99,9	99,3	99,3	100,0	99,7
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	86,2	11,5	8,5	7,9	1,1	4,4	4,7	25,0	24,0	0,0	0,0	0,7	6,8	0,0	0,1	0,7	0,7	0,0	0,3
Törzs (beteg)	11530	24755	22221	20039	25873	10523	6752	24418	25784	9158	6798	12515	16557	339	4982	9201	25684	12398	2634
Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek																			
Érzékeny (%)	10,4	76,2	76,0	77,9	98,2	95,0	95,5	71,4	71,3	100,0	100,0	98,5	93,0	86,9	99,9	99,3	99,2	100,0	99,6
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	89,6	23,8	23,9	22,0	1,8	5,0	4,5	28,5	28,6	0,0	0,0	1,4	7,0	1,1	0,1	0,7	0,8	0,0	0,4
Törzs (beteg)	12269	18873	16722	14402	19852	11985	9197	17894	19715	9071	5364	11890	15115	852	4960	7915	19385	11544	2136