

A monitor rendszerben 2008. évben *Enterococcus* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Levofloxacin	Ciprofloxacín	Vancomycin	Teicoplanin	Quinupristin\ dalphopristin	Linezolid
--------------	------------	----------------------------	------------------------------	--------------	---------------	------------	-------------	--------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>									
Érzékeny (%)	99,3	71,4	71,0	69,3	35,0	99,99	100,0	0,01	99,7
Mérsékelt (%)	0,1			11,6	39,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Rezisztens (%)	0,7	28,6	28,9	19,1	25,8	0,01	0,0	99,99	0,3
Törzs (beteg)	18763	11108	2594	10546	14343	17014	8509	758	1755

<i>Enterococcus faecium</i>									
Érzékeny (%)	8,0	42,4	46,0	16,9	8,1	98,8	99,2	50,5	97,1
Mérsékelt (%)	0,3			3,3	6,8	0,0	0,0	3,2	0,0
Rezisztens (%)	91,7	57,6	53,9	79,8	85,1	1,2	0,8	46,3	2,9
Törzs (beteg)	615	505	165	396	396	649	389	95	139